



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE SALUD



B.C.S. PANORAMA EPIDEMIOLOGICO DE LA SEMANA 44-2017

MORBILIDAD GENERAL, INFLUENZA PERIODO ESTACIONAL

FUENTE: PLATAFORMA SINAVE. SSA
CORTE DE INFORMACION
RESPONSABLE: DR. MAURICIO E. BERNAL HERNANDEZ
APOYO TECNICO: ING. ERNESTO NAVARRO
26-10-2017



MORBILIDAD GENERAL

DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Prontuario semana 44-2017

| 20 PRINCIPALES CAUSAS DE DX | 2017 | 2016 | Variación % |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Infecciones respiratorias agudas * | 206423 | 164,358 | 25.59 |
| Enfermedades diarreicas agudas** | 53082 | 37,972 | 39.79 |
| Infección de vías urinarias | 40509 | 35,746 | 13.32 |
| Gingivitis y enfermedad periodontal | 15070 | 12,886 | 16.95 |
| Conjuntivitis | 12216 | 8,851 | 38.02 |
| Úlceras, gastritis y duodenitis | 11501 | 8,372 | 37.37 |
| Otitis media aguda | 10849 | 3,977 | 172.79 |
| Obesidad | 6322 | 6,416 | -1.47 |
| Enfermedades de Transmisión Sexual *** | 3572 | 1,217 | 193.51 |
| Hipertensión arterial | 2855 | 2,541 | 12.36 |
| Asma | 1959 | 1,748 | 12.07 |
| Diabetes mellitus | 1905 | 1,976 | -3.59 |
| Varicela | 1726 | 2,846 | -39.35 |
| Insuficiencia venosa periférica | 1679 | 918 | 82.90 |
| Otras helmintiasis | 1409 | 2,247 | -37.29 |
| Depresión | 929 | 730 | 27.26 |
| Quemaduras | 893 | 1,194 | -25.21 |
| Hiperplasia de la próstata | 747 | 597 | 25.13 |
| Accidentes de transporte en vehículos con motor | 604 | 732 | -17.49 |
| Desnutrición leve | 481 | 628 | -23.41 |
| Total : | 392,161 | 323,207 | 21.33 |

Fuente: EPIMORBI-SUAVE.

Corte de información: 26-10-2017

*Incluye: infección respiratoria aguda, faringitis, amigdalitis estreptocócica, neumonía, bronconeumonía e influenza.

**Incluye: amibiasis intestinal, shigelosis, fiebre tifoidea, giardiasis, enfermedad diarreica aguda, intoxicación alimentaria bacteriana, paratifoidea, otras salmonelosis y otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

***Incluye: VIH, candidiasis urogenital, herpes genital, infección gonocócica genitourinaria, linfogranuloma venéreo, sífilis adquirida, tricomoniasis urogenital, chancro blando y vulvovaginitis aguda.

Incluye diabetes mellitus tipo 1 y 2.

(Incluye información de Consultorios Anexos a Farmacia)

Nota: información disponible en el sistema de notificación, para el mismo período en ambos años.

Reporte nacional semanal de influenza 2017

| DGE | | DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA | | | | INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | INFLUENZA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------|-----------|
| INFORMACIÓN DE LA TEMPORADA DE INFLUENZA 2017-2018 | | | | | | | | | | |
| Tabla 4. Proporción de casos positivos y defunciones por influenza según entidad federativa. México, Temporada de influenza 2017-2018 | | | | | | | | | | |
| Entidad Federativa | Casos ET/IRAG | Casos positivos a influenza | %* | Defunciones por influenza | Entidad Federativa | Casos ET/IRAG | Casos positivos a influenza | %* | Defunciones por influenza | |
| AGUASCALIENTES | 105 | 0 | 0.0 | 0 | MORELOS | 48 | 1 | 2.1 | 0 | |
| BAJA CALIFORNIA | 26 | 0 | 0.0 | 0 | NAYARIT | 90 | 2 | 2.2 | 0 | |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 66 | 1 | 1.5 | 0 | NUEVO LEÓN | 225 | 10 | 4.4 | 0 | |
| CAMPECHE | 66 | 0 | 0.0 | 0 | OAXACA | 76 | 0 | 0.0 | 0 | |
| COAHUILA | 60 | 0 | 0.0 | 0 | PUEBLA | 153 | 0 | 0.0 | 0 | |
| COLIMA | 71 | 6 | 8.5 | 0 | QUERÉTARO | 98 | 0 | 0.0 | 0 | |
| CHIAPAS | 104 | 3 | 2.9 | 0 | QUINTANA ROO | 111 | 3 | 2.7 | 0 | |
| CHIHUAHUA | 69 | 0 | 0.0 | 0 | SAN LUIS POTOSÍ | 52 | 3 | 5.8 | 0 | |
| CIUDAD DE MÉXICO | 288 | 1 | 0.3 | 0 | SINALOA | 56 | 1 | 1.8 | 0 | |
| DURANGO | 27 | 0 | 0.0 | 0 | SONORA | 20 | 1 | 5.0 | 0 | |
| GUANAJUATO | 22 | 0 | 0.0 | 0 | TABASCO | 91 | 0 | 0.0 | 0 | |
| GUERRERO | 127 | 10 | 7.9 | 0 | TAMAULIPAS | 24 | 1 | 4.2 | 0 | |
| HIDALGO | 130 | 0 | 0.0 | 0 | TLAXCALA | 205 | 6 | 2.9 | 0 | |
| JALISCO | 134 | 1 | 0.7 | 0 | VERACRUZ | 312 | 2 | 0.6 | 0 | |
| ESTADO DE MÉXICO | 260 | 0 | 0.0 | 0 | YUCATÁN | 51 | 4 | 7.8 | 0 | |
| MICHOACÁN | 127 | 3 | 2.4 | 0 | ZACATECAS | 183 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Total general | | | | | | 3,477 | 59 | 1.7 | 0 | |

*% de casos positivos a influenza respecto a los casos ET/IRAG

Fuente: SINAVE/DGE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 2/11/2017.



Morbilidad General edas 2017

DGE DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA **INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA** EDA

Información hasta la semana epidemiológica 44 del 2017

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 40 hasta la semana 44, por entidad federativa, México 2017.

| Entidad | Semana Epidemiológica | | | | | Entidad | Semana Epidemiológica | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Aguascalientes | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | Morelos | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.0 |
| Baja California | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | Nayarit | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 1.7 |
| Baja California Sur | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 4.8 | 4.1 | Nuevo León | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
| Campeche | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | Oaxaca | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.1 |
| Coahuila | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | Puebla | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
| Colima | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | Querétaro | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
| Chiapas | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | Quintana Roo | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
| Chihuahua | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | San Luis Potosí | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.1 |
| Distrito Federal | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | Sinaloa | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 |
| Durango | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | Sonora | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 6.7 |
| Guanajuato | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | Tabasco | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 |
| Guerrero | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | Tamaulipas | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
| Hidalgo | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | TLaxcala | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 1.5 |
| Jalisco | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | Veracruz | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
| México | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | Yucatán | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 3.3 |
| Michoacán | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | Zacatecas | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.0 |
| | | | | | | Nacional | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |

Información relevante

Tabla 1:

En la semana epidemiológica 44, 3 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 3 principales:

Sonora (191.3 %)
 Yucatán (32.0 %)
 Querétaro (7.7 %)

Figura 1:

La entidad federativa con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 44 es:

Sonora (6.7)

Precedida por Baja California Sur (4.1).

En 3 de las 32 entidades federativas

Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 44, México, 2017.



Gráfica 1. Casos notificados de EDA, México 2012 - 2017.